[causa]

[cause]

причина ||

justification [обоснование]

reason

raison

assumption

P_1 , P_1

inference

A

[conclusion]

ration

заключение

[συλλογισμός]

[dialog]

xRy

[x ¬y]

>(x, y)

$R(x, y)$

x: X y: Y

m: X

m R всех y

для любого есть (y∈y) такой x, что

x R y — логическое слово [посылки] — домен / область [всех индивидов]

1. Маша любит |всех| мальчиков — [вывод]

Любого мальчика любит по крайней мере одна девочка. [заключение]

Кислотная прямота

[логичность вывода]

2 [истина]

Лакмусовая бумажка стала красной

Перед нами кислота

1) Маша: девочка

2) Маша суще. [и единственна!]

$\forall$ $\exists$ — для любого / существует — кванторы

Путь $x : X$ — (девочки) точки

$M : X$ (мальчики)

$y : Y$ — прямые

Логическая форма

Схема (интерпретация)

$\forall y . M R y$

$\forall y \exists x . x R y$

xRy: точка x лежит на прямой y

(девочка любит мальчика y)

Модель

Логический квадрат



$\exists$ — квантор существования

$\forall$ — квантор всеобщности

$x : X$

$M : X, y : Y$

$\forall y . M R y$

$\forall y \exists x . x R y$

(1) ..... A .....

$\frac{A}{B}$ $\qquad$ $\frac{A}{\ }$

«Пропущенная» предпосылка:

(2) [если лакмус краснеет, то [перед нами кислота] B

[импликация →

$\frac{A}{2\times2=4}$ (зачёркнуто)

$\frac{(1),\ (2)}{(3)}$

антецедент [если A, то B

[консеквент A → B

A — я круг

B — у меня нет углов

$\frac{A,\ A \to B}{B}$ [modus ponens]

$\frac{A,\ A \to B}{B}$

(Классическая) Логика высказываний

[Высказывание] — [декларативное предложение], [утверждение], [суждение], [предложение], то, что принимает истинностное значение (что м.б. [истинным], [ложным])

$2 \times 2 = 4$ — истинное высказывание

$2 \times 2 = 5$ — ложное высказывание

( ) ( )(a)

Синтаксис	атомарные высказывания
Семантика	p, q, r , производственные связки

конъюнкция
дизъюнкция
импликация

)(